

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1: Khi nói về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng?

- (1) Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi nhiễm sắc thể có duy nhất một trình tự nuclêôtit này.
(2) Tâm động là vị trí liên kết của nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.

(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể.

(4) Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi.

(5) Tuỳ theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể có thể khác nhau.

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (5).

C. (3), (4), (5).

D. (1), (3), (4).

Câu 2: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn ruồi mắt đỏ?

A. $X^AX^a \times X^AY$.

B. $X^aX^a \times X^AY$.

C. $X^AX^a \times X^aY$.

D. $X^AX^A \times X^aY$.

Câu 3: Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen (A và a) nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1. Do đột biến, trong loài này đã xuất hiện các thể ba ở nhiễm sắc thể số 1. Các thể ba này có thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen đang xét?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 4: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, khi cho cơ thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thu được đời con gồm

A. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.

B. 8 kiểu gen và 6 kiểu hình.

C. 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.

D. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình.

Câu 5: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn các hành động nào sau đây?

(1) Khai thác thủy, hải sản vượt quá mức cho phép.

(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

(3) Sản bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.

(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.

(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,...

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (4), (5).

D. (1), (3), (5).

Câu 6: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể.

B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm gia tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho một số gen trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác.

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể.

Câu 7: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật nào sau đây thuộc kiểu biến động theo chu kì?

A. Quần thể cá chép ở Hồ Tây bị giảm số lượng cá thể sau thu hoạch.

B. Quần thể ếch đồng ở miền Bắc tăng số lượng cá thể vào mùa hè.

C. Quần thể tràm ở rừng U Minh bị giảm số lượng cá thể sau cháy rừng.

D. Quần thể thông ở Đà Lạt bị giảm số lượng cá thể do khai thác.

Câu 8: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

B. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hoá diễn ra phổ biến ở cả động vật và thực vật.

C. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

D. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.

Câu 9: Để phát triển một nền kinh tế - xã hội bền vững, chiến lược phát triển bền vững cần tập trung vào các giải pháp nào sau đây?

(1) Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh.

(2) Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh.

(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật,...).

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.

(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu hóa học,... trong sản xuất nông nghiệp.

A. (1), (3), (4).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (2), (5).

D. (2), (4), (5).

Câu 10: Trong cơ chế điều hoà hoạt động các gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?

A. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.

B. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó.

C. Các phân tử mARN của các gen cấu trúc Z, Y, A được dịch mã tạo ra các enzym phân giải đường lactôzơ.

D. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

Câu 11: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai $AaBbddEe \times AabbDdEe$, số cá thể có kiểu gen $AAbbDdee$ chiếm tỉ lệ

A. 1/8.

B. 1/64.

C. 1/16.

D. 1/32.

Câu 12: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F_1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?


A. $\frac{Ab}{aB} \times \frac{ab}{ab}$.

B. $AABb \times aabb$.

C. $AaBb \times aabb$.

D. $\frac{AB}{ab} \times \frac{ab}{ab}$.

Câu 13: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một gen có hai alen quy định.



Ghi chú: ○ : Nữ bình thường

● : Nữ bị bệnh

□ : Nam bình thường

■ : Nam bị bệnh

Cho biết không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?

A. Alen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

B. Alen gây bệnh là alen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Alen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

D. Alen gây bệnh là alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Câu 14: Giả sử quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá cũng như không xảy ra sự xuất cư và nhập cư. Gọi b là mức sinh sản, d là mức tử vong của quần thể. Kích thước quần thể chắc chắn sẽ tăng khi

A. $b = d = 0$.

B. $b = d \neq 0$.

C. $b > d$.

D. $b < d$.

Câu 15: Khi nói về tuổi cá thể và tuổi quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Mỗi quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng và không thay đổi.

B. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể.

C. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.

D. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

Câu 16: Khi nói về quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hoá sinh học.

B. Sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

C. Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

D. Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.

Câu 17: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định cánh hoa thẳng trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa cuộn. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F_1 gồm toàn cây hoa đỏ, cánh thẳng. Cho các cây F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 gồm 25% cây hoa đỏ, cánh cuộn; 50% cây hoa đỏ, cánh thẳng; 25% cây hoa vàng, cánh thẳng. Cho biết không xảy ra đột biến, từ kết quả của phép lai trên có thể rút ra kết luận:

A. kiểu gen của các cây F_1 là $Aabb$, các gen phân li độc lập.

B. kiểu gen của các cây F_1 là $\frac{AB}{ab}$, các gen liên kết hoàn toàn.

C. kiểu gen của các cây F_1 là $\frac{Ab}{aB}$, các gen liên kết hoàn toàn.

D. kiểu gen của các cây F_1 là $AaBb$, các gen phân li độc lập.

Câu 18: Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,...

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thủy sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn.

(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

A. (3)→(4)→(2)→(1). B. (2)→(1)→(4)→(3). C. (1)→(3)→(4)→(2). D. (1)→(2)→(3)→(4).

Câu 19: Nhân tố nào sau đây tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Đột biến.

C. Giao phối ngẫu nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 20: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng (P), thu được các hợp tử. Dùng cônixin xử lý các hợp tử, sau đó cho phát triển thành các cây F₁. Cho một cây F₁ tự thụ phấn thu được F₂ gồm 176 cây quả đỏ và 5 cây quả vàng. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ tạo giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, các cây F₂ thu được có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 21: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 408 nm và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:

A. T = 801; G = 399.

B. T = 401; G = 799.

C. T = 399; G = 801.

D. T = 799; G = 401.

Câu 22: Những bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

(4) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

A. (1), (2), (5).

B. (2), (4), (5).

C. (2), (3), (5).

D. (1), (3), (4).

Câu 23: Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu loại giao tử được tạo ra từ quá trình

giảm phân của cơ thể có kiểu gen $Aa \frac{BD}{bd}$?

A. 8.

B. 6.

C. 4.

D. 2.

Câu 24: Ở một loài động vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Có bốn quần thể thuộc loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền về gen trên và có tỉ lệ kiểu hình lặn như sau:

Quần thể	Quần thể 1	Quần thể 2	Quần thể 3	Quần thể 4
Tỉ lệ kiểu hình lặn	64%	6,25%	9%	25%

Trong các quần thể trên, quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử cao nhất?

A. Quần thể 2.

B. Quần thể 3.

C. Quần thể 1.

D. Quần thể 4.

Câu 25: Trong kỹ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta có thể sử dụng hai loại thể truyền là

A. nhiễm sắc thể nhân tạo và plasmit.

B. plasmit và virut.

C. nhiễm sắc thể nhân tạo và virut.

D. plasmit và nấm men.

Câu 26: Phương pháp nào sau đây **không** được sử dụng để tạo ưu thế lai?

A. Lai khác dòng kép.

B. Lai khác dòng đơn.

C. Lai phân tích.

D. Lai thuận nghịch.

Câu 27: Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất

A. luôn tồn tại thành từng cặp alen.

B. chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.

C. chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.

D. luôn phân chia đều cho các tế bào con.

Câu 28: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây **sai**?

(1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

(2) Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.

(3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5' → 3' để tổng hợp mạch mới theo chiều 3' → 5'.

(4) Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.

A. (2), (4).

B. (1), (3).

C. (1), (4).

D. (2), (3).

Câu 29: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp cá trong Hồ Tây.

B. Tập hợp cây cỏ trong một ruộng lúa.

C. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.

D. Tập hợp côn trùng trong rừng Cúc Phương.

Câu 30: Ở những loài sinh sản hữu tính, từ một quần thể ban đầu tách thành hai hoặc nhiều quần thể khác nhau. Nếu các nhân tố tiến hoá đã tạo ra sự phân hoá về vốn gen giữa các quần thể này, thì cơ chế cách li nào sau đây khi xuất hiện sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới?

A. Cách li sinh sản.

B. Cách li nơi ở.

C. Cách li địa lí.

D. Cách li sinh thái.

A. 4. **B. 8.** **C. 16.** **D. 9.**

Câu 32: Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?

- Câu 32:** Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?

A. (1), (2), (4). **B.** (3), (4), (5). **C.** (2), (3), (5). **D.** (1), (3), (5).

A. đột biến. **B.** giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 34: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lý thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ chiếm tỉ lệ

- Câu 35:** Ở người, bệnh máu khó đông do alen lặn a nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội A quy định máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng đều có máu đông bình thường, sinh được hai người con: người con thứ nhất là con gái và có máu đông bình thường, người con thứ hai bị bệnh máu khó đông. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của hai người con lần lượt là:

- C.** $X^A X^A$ và $X^a X^a$ hoặc $X^A X^a$ và $X^a X^a$.

A. 50% AA : 50% aa. **B.** 25% AA : 50% Aa : 25% aa.

- Câu 37:** Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A.** Các thể tự đa bội lẻ ($3n, 5n, \dots$) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường.
B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.
C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ trong tế bào đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bội.
D. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu thường là tự đa bội lẻ.

A. $3/4$. **B.** $1/2$. **C.** $1/4$. **D.** $2/3$.

A. Hình thành loài mới được xem là ranh giới giữa tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.

C. Tiến hoá nhỏ trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.

Câu 40: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng?

- (1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực.
- (2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
- (3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.
- (4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với codon 5' UUG 3' trên phân tử mARN.

- A.** (1), (4). **B.** (1), (3). **C.** (2), (3). **D.** (2), (4).

Trang 4/4 - Mã đề thi 279